

УДК 517.948

МАТЕМАТИКА

Г. Г. МИХАЙЛИЧЕНКО

РЕШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ТЕОРИИ  
ФИЗИЧЕСКИХ СТРУКТУР

(Представлено академиком А. Д. Александровым 23 IX 1970)

В работе <sup>(1)</sup> Ю. И. Кулаковым была дана математическая формулировка теории физических структур. Там же рассмотрен простейший случай с использованием метода параметризации. В настоящей работе дается более естественная формулировка аксиом физической структуры и приводится решение функциональных уравнений, возникающих в данной теории.

Пусть имеются два множества  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$ , элементы которых обозначаются латинскими и греческими буквами соответственно, и вещественная функция  $a: \mathfrak{M} \times \mathfrak{N} \rightarrow R$ , сопоставляющая каждой паре  $\langle i, a \rangle \in \mathfrak{M} \times \mathfrak{N}$  некоторое число  $a_{ia} = (i, a) \in R$ . Два элемента  $i, j \in \mathfrak{M}$  будем считать различными,  $i \neq j$ , если во множестве  $\mathfrak{N}$  найдется хотя бы один такой элемент  $a$ , что  $(i, a) \neq (j, a)$ . Если же для любого  $a \in \mathfrak{N}$  имеет место  $(i, a) = (j, a)$ , то элементы  $i, j$  будем считать совпадающими,  $i = j$ . Аналогично определяется различие или совпадение элементов  $\alpha, \beta$  из множества  $\mathfrak{N}$ . Будем предполагать, что в обоих множествах отождествлены все совпадающие элементы.

На множествах  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  введем топологию, определив фундаментальные системы окрестностей. Пусть  $i_0 \in \mathfrak{M}$  — некоторый фиксированный элемент и  $\varepsilon > 0$ . Обозначим через  $A\{i_0, \varepsilon\}$  совокупность всех тех элементов  $i \in \mathfrak{M}$ , для которых выполняется неравенство  $|(i, a) - (i_0, a)| < \varepsilon$ . Семейство всех множеств  $A\{i_0, \varepsilon\}$  для всевозможных значений положительного числа  $\varepsilon$  образует фундаментальную систему окрестностей точки  $i_0$ . Аналогично определяется окрестность  $A\{a_0, \delta\}$  и фундаментальная система окрестностей точки  $a_0 \in \mathfrak{N}$ . Топология на прямом произведении  $\mathfrak{M} \times \mathfrak{N}$  вводится через топологии сомножителей обычным образом.

Пусть  $m \geq n \geq 2$  и  $\mathfrak{M}^m$  и  $\mathfrak{N}^n$  соответственно  $m$ -кратное и  $n$ -кратное прямое произведение множеств  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  на себя. С помощью функции  $a: \mathfrak{M} \times \mathfrak{N} \rightarrow R$ , построим отображение  $\mathfrak{M}^m \times \mathfrak{N}^n \rightarrow R^{mn}$ , сопоставляя каждому кортежу  $\langle ijk \dots v, \alpha\beta\gamma \dots \tau \rangle \in \mathfrak{M}^m \times \mathfrak{N}^n$  длины  $m+n$  числовую матрицу размера  $m \times n$

$$(ijk \dots v, \alpha\beta\gamma \dots \tau) = \begin{vmatrix} (i, \alpha) & (j, \alpha) \dots (v, \alpha) \\ (i, \beta) & (j, \beta) \dots (v, \beta) \\ \dots & \dots \\ (i, \tau) & (j, \tau) \dots (v, \tau) \end{vmatrix}, \quad (1)$$

которую можно рассматривать как точку пространства  $R^{mn}$ .

Множество значений функции  $\mathfrak{M}^m \times \mathfrak{N}^n \rightarrow R^{mn}$  обозначим через  $N$ .

Говорят, что на множествах  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  задана бинарная физическая структура ранга  $(m, n)$ , если выполнены следующие условия:

А) Отображение  $a[\beta\gamma\dots\tau]: \mathfrak{M} \rightarrow R^{n-1}$ , задаваемое функцией  $i \mapsto (i, \beta\gamma\dots\tau)$ , открыто для любого недиагонального кортежа  $\langle \beta\gamma\dots\tau \rangle \in \mathfrak{N}^{n-1}$ , где  $\beta \neq \gamma \neq \dots \neq \tau$ ; отображение  $a[jk\dots v]: \mathfrak{N} \rightarrow R^{m-1}$ , задаваемое функцией  $a \mapsto (jk\dots v, a)$ , открыто для любого недиагонального кортежа  $\langle jk\dots v \rangle \in \mathfrak{M}^{m-1}$ , где  $j \neq k \neq \dots \neq v$ .

Б) Существует аналитическая функция  $\Phi(u_1, u_2, \dots, u_m)$ , определенная в области  $\mathcal{E} \subset R^{mn}$ , такая, что множество  $M \subset \mathcal{E}$ , определяемое уравнением  $\Phi(u_1, u_2, \dots, u_m) = 0$ , есть непустое связное множество.

В) Градиент  $\Phi$  отличен от нуля всюду на  $M$ , за исключением, может быть, множества поверхности меры нуль.

Г) Совокупность  $N$  всех точек  $(ijk\dots v, \alpha\beta\gamma\dots\tau) \in R^{mn}$  образует открытую относительно  $M$  подмножество множества  $M$ , так что

$$\Phi[(ijk\dots v, \alpha\beta\gamma\dots\tau)] = 0 \quad (2)$$

для любого кортежа  $\langle ijk\dots v, \alpha\beta\gamma\dots\tau \rangle \in \mathfrak{M}^m \times \mathfrak{N}^n$ .

Теорема. Если тройка  $\langle \mathfrak{M}, \mathfrak{N}, a: \mathfrak{M} \times \mathfrak{N} \rightarrow R \rangle$  образует бинарную физическую структуру ранга  $(m, n)$ , то в любых окрестностях  $A\{i_0, \varepsilon\}$  и  $A\{a_0, \delta\}$  произвольных точек  $i_0 \in \mathfrak{M}$  и  $a_0 \in \mathfrak{N}$  найдутся элементы  $i_1 \in A\{i_0, \varepsilon\}$  и  $a_1 \in A\{a_0, \delta\}$ , в некоторых окрестностях  $P \subset A\{i_0, \varepsilon\}$  и  $Q \subset A\{a_0, \delta\}$  которых функция  $a: P \times Q \rightarrow R$  и аналитическое множество  $N_1 \subset N$  значений функции  $P^m \times Q^n \rightarrow R^{mn}$  могут быть представлены в виде:

а) для  $m = n = 2$

$$(i, a) = \Psi^{-1}(x_i + \xi_a),$$

$$\Psi[(i, a)] - \Psi[(i, \beta)] - \Psi[(j, a)] + \Psi[(j, \beta)] = 0; \quad (3)$$

б) для  $m = 4, n = 2$

$$(i, a) = \Psi^{-1}[(x_i \xi_a^1 + \xi_a^2) / (x_i + \xi_a^3)],$$

$$\begin{vmatrix} \Psi[(i, a)] & \Psi[(i, \beta)] & \Psi[(i, a)] \times \Psi[(i, \beta)] & 1 \\ \Psi[(j, a)] & \Psi[(j, \beta)] & \Psi[(j, a)] \times \Psi[(j, \beta)] & 1 \\ \Psi[(k, a)] & \Psi[(k, \beta)] & \Psi[(k, a)] \times \Psi[(k, \beta)] & 1 \\ \Psi[(l, a)] & \Psi[(l, \beta)] & \Psi[(l, a)] \times \Psi[(l, \beta)] & 1 \end{vmatrix} = 0; \quad (4)$$

в) для  $m = n \geq 3$

$$(i, a) = \Psi^{-1}(x_i^1 \xi_a^1 + \dots + x_i^{m-2} \xi_a^{m-2} + x_i^{m-1} \xi_a^{m-1}),$$

$$\begin{vmatrix} \Psi[(i, a)] & \Psi[(i, \beta)] & \dots & \Psi[(i, \tau)] \\ \Psi[(j, a)] & \Psi[(j, \beta)] & \dots & \Psi[(j, \tau)] \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Psi[(v, a)] & \Psi[(v, \beta)] & \dots & \Psi[(v, \tau)] \end{vmatrix} = 0, \quad (5)$$

а также

$$(i, a) = \Psi^{-1}(x_i^1 \xi_a^1 + \dots + x_i^{m-2} \xi_a^{m-2} + x_i^{m-1} + \xi_a^{m-1}),$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \Psi[(i, a)] & \Psi[(i, \beta)] & \dots & \Psi[(i, \tau)] \\ 1 & \Psi[(j, a)] & \Psi[(j, \beta)] & \dots & \Psi[(j, \tau)] \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \Psi[(v, a)] & \Psi[(v, \beta)] & \dots & \Psi[(v, \tau)] \end{vmatrix} = 0; \quad (6)$$

г) для  $m = n + 1 \geq 3$

$$(i, a) = \Psi^{-1}(x_i^1 \xi_a^1 + \dots + x_i^{m-2} \xi_a^{m-2} + \xi_a^{m-1}),$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \Psi[(i, a)] & \Psi[(i, \beta)] & \dots & \Psi[(i, \tau)] \\ 1 & \Psi[(j, a)] & \Psi[(j, \beta)] & \dots & \Psi[(j, \tau)] \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \Psi[(v, a)] & \Psi[(v, \beta)] & \dots & \Psi[(v, \tau)] \end{vmatrix} = 0, \quad (7)$$

где  $\Psi$  — строго монотонная, аналитическая в окрестности точки  $(i_1, a_1) \in R$  функция одной переменной,  $\Psi^{-1}$  — обратная функция,  $x_i, \xi_a$  — независимые параметры;

д) для  $m = n \geq 2$ , кроме случая  $m = 4, n = 2$ , бинарные физические структуры не существуют.

Заметим, что полученный результат сформулирован в локальном смысле. Возможности аналитического продолжения результата на все множество  $N$  еще не выяснены. Ограничение  $m \geq n$ , очевидно, несущественно. Легко переписать теорему для случая  $m \leq n$ . Существование решений (5), (7) предположил Ю. И. Кулаков <sup>(2)</sup>. Решения (4) и (6) впервые были обнаружены автором <sup>(3)</sup>.

По аналогичной схеме можно ввести тернарные физические структуры ранга ( $m, n, p$ ) на трех множествах  $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, \mathfrak{Q}$ . Однако предварительные исследования показывают, что тернарные структуры существуют только в простейшем случае  $m = n = p = 2$ , в отличие от бинарных структур, рассмотренных в данной работе. Возможно, в этом состоит причина несодержательности теории трехмерных определителей. С другой стороны, заметим, что определители (5) и (6) имеют строение определителей Кэли — Менгера и Грама.

Автор выражает глубокую благодарность Ю. Г. Решетняку за многочисленные полезные замечания и обсуждения, способствовавшие более четкой формулировке исходных аксиом физической структуры.

Новосибирский государственный  
университет

Поступило  
11 IX 1970

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> Ю. И. Кулаков, Сиб. матем. журн., 12, № 5, 1142 (1971). <sup>2</sup> Ю. И. Кулаков, Элементы теории физических структур, Новосибирск, 1968. <sup>3</sup> Г. Г. Михайличенко, Математическое дополнение к <sup>(2)</sup>.